



RACCOMANDAZIONI GENERALI PER GLI INTERVENTI VACCINALI

Tutti i gatti dovrebbero essere regolarmente sottoposti alla vaccinazione Trivalente contro la Rinotracheite da Herpes Virus, la Gastroenterite virale da Parvovirus, e la Calicivirosi da Calici Virus, il cui richiamo annuale è obbligatorio, sia per la pericolosità di queste patologie sia per raggiungere l'immunità di gregge ed evitare che si diffondano nei vari soggetti presenti.

L'impiego dei vaccini ed i programmi vaccinali devono essere effettuati direttamente dal veterinario e sotto il suo stretto controllo.

Ciò garantisce la massima efficacia dell'intervento immunizzante che viene eseguito nel contesto di valutazione sanitaria generale del animale.

La complessità della risposta immunitaria, infatti, richiede un'approfondita conoscenza di tutti i fattori che possono influenzarlo.

Una vaccinazione correttamente eseguita costituisce l'unico mezzo dimostratosi efficace per prevenire e ridurre l'incidenza di gravi malattie infettive frequentemente mortali e incurabili o durante tutta la vita.

E' pertanto fondamentale provvedere alla sua vaccinazione fin da cucciolo, continuando poi con richiami periodici.

La vaccinazione di base può richiedere diversi interventi vaccinali per essere completa, poiché non è possibile conoscere l'entità delle protezioni anticorpali che ogni cucciolo ha avuto dalla madre e che può influenzare la sua risposta alla vaccinazione.

Poiché le malattie infettive da prevenire sono diverse, vengono usati vaccini sia monovalenti che polivalenti, il cui impiego corretto si è dimostrato efficace e sicuro a la cui produzione è sottoposta a rigorosi controlli.

Il veterinario curante adotterà il protocollo vaccinale che meglio si adegua all'età, alla condizione e allo stato di vita dell'animale.